

## KULLANMA TALİMATI

**XENETIX 350 (350 mg iyot /mL) enjeksiyonluk solüsyon**  
**Damar içi yolla kullanılır.**

- **Etkin madde:** 1 mL enjeksiyonluk solüsyonda 767.8 mg İobitridol bulunmaktadır.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum, kalsiyum edetat, trometamol, trometamol hidroklorür, sodyum hidroksid veya hidroklorik asit (pH dengeleyici olarak) ve enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

**Bu kullanma talimatında:**

1. **XENETIX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **XENETIX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **XENETIX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **XENETIX'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### 1. XENETIX nedir ve ne için kullanılır?

XENETIX, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

XENETIX, radyolojik tetkikler sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır. Görüntü kalitesini artırmak, belli organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar.

XENETIX, yalnızca teşhis amaçlı kullanılır.

### 2. XENETIX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bu bölümdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

XENETIX'i kullanmadan önce doktorunuzla birlikte buradaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.

### XENETIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer XENETIX'in içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

- Eđer daha 6nceden bu ilaca karřı erken (tetkik esnasında) veya ge (tetkikten sonraki 7 g6ne kadar) d6nemde alerji g6stermiřseniz,
- Zehirli guatr ataęı durumunda,
- Eđer hamileyseniz 6reme organlarına dair bazı 6zel tetkiklerde.

### **XENETIX'i ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer durumunuz ařaęıdakilerden birine uyuyorsa doktorunuzu bilgilendirin:

- Daha 6nceki bir tetkik sırasında kontrast ilaca karřı alerjik reaksiyon g6sterdiyseniz
- Eđer daha 6nce İobitridol enjeksiyonunu takiben geirilmif bir alerjik reaksiyonunuz varsa (bakınız B6l6m 4 Olası Yan Etkileri nelerdir?),
- Astım hastalıęınız varsa veya tetkikten 8 g6n 6ncesine kadar bir astım ataęı geirdiyseniz,
- Beta blok6r (kalp ve tansiyon hastalıęında kullanılan bir ila) tedavisi alıyorsanız,
- B6brek problemleriniz varsa,
- Karacięer hastalıęınız varsa,
- Kalp ya da damarlarınızı etkileyen bir hastalıęınız varsa,
- N6betler geirdiyseniz ya da sara hastalıęı (epilepsi) tedavisi alıyorsanız,
- Kalp yetmezlięiniz (kalp fonksiyonlarının yetersizlięi) varsa,
- Őeker hastalıęınız varsa (y6ksek kan řekeriyle seyreden metabolik bir hastalık)
- İnce (fel) ya da yakın zamanda beyin kanaması geirdiyseniz (kafatası ierisinde kanama)
- Miyasteni hastalıęınız (kas hastalıęı) varsa,
- Mevcut ya da geirilmif bir guatr (tiroid) hastalıęınız varsa,
- Feokromastoma hastalıęınız (ciddi kan basıncı y6kseklieine yol aan artmif hormon salınımı) varsa,
- Kemik ilięi hastalıęınız (monoklonal gammapati, multiple miyelom ya da Waldenstr6m hastalıęı) varsa,
- Yakın zamanda guatr (tiroid) tetkiki ya da tedavisi amacıyla radyoaktif iyot kullanılacaksa,
- D6zenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız ya da ila alıyorsanız,
- Anksiyete, sinirlilik ya da aęrınız varsa (olası yan etkiler daha fazla hissedilebilir)

T6m bu durumlarda doktorunuz ilacın saęlayacaęı yararlar ile yaratacaęı riski g6z 6n6ne olarak XENETIX kullanacaktır. Uygulanan ilacın v6cudunuzdan atılımını hızlandırmak ve b6breklerinizin etkilenme riskini en aza indirmek iin uygulanma 6ncesi ve sonrasında doktorunuz sizden su ya da sıvı iecekler imenizi 6nerebilir. Eđer doktorunuz XENETIX kullanırsa gerekli 6nlemleri alacak ve uygulama sırasında sizi yakından takip edecektir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l6tfen doktorunuza danıřınız.

### **XENETIX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

XENETIX'in yiyecek ve ieceklerle bilinen bir etkileřimi yoktur. Buna raęmen, ekimden 6nce bir řey yememek ya da imemek ile ilgili doktorunuz ya da eczanıza danıřın.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da adetiniz geciktiyse bunu hemen doktorunuza söyleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

XENETIX kullanıldıktan sonraki 24 saat içinde bebeğinizi emzirmeyi bırakın. XENETIX sütünüze geçebilir.

## **Araç ve makine kullanımı**

XENETIX araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez. Çekimden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız araç ya da makine kullanmamalısınız.

## **XENETIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgi:**

Bu ürün her 100 mL'de 116 mg sodyum (tuz) içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

## **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

XENETIX'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Ancak özellikle;

- Kalp ve yüksek tansiyon tedavisi için beta-blokör ya da diüretik ilaçlar kullanıyorsanız
- Şeker hastalığı tedavisi için ilaç (metformin) kullanıyorsanız
- Yakın zamanda interlökin-2 tedavisi aldıysanız, bunu doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka bildiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. XENETIX nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

XENETIX damar içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Uygulama sırasında doktor gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damarınıza bir plastik iğne takılacak. Uygulama sırasında herhangi bir alerjiniz olursa XENETIX verilmesi durdurulacaktır.

Uygulama hastane, klinik ya da özel merkezlerde yapılacaktır. Çekimi yapanlar uygulama ile ilgili alınması gereken önlemleri bilmektedirler ve ortaya çıkabilecek olası rahatsızlıklardan haberdardırlar.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda XENETIX kullanılabilir.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda XENETIX kullanımına dair özel bir gereksinim bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek Yetmezliği:** Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması önerilir. Böbrek yetmezliği teşhisi aldıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

**Kalp Hastalıkları:** Kalp yetmezliği veya hipertansiyon gibi herhangi bir kalp hastalığınız veya kalp atımlarınızda düzensizlik varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

#### **Kullanmanız gerekenden fazla XENETIX kullandıysanız aldıysanız**

Size kullanmanız gerekenden fazla doz verilmesi ihtimali yoktur. XENETIX, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. XENETIX, kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında, hemodiyaliz (kan temizlenmesi) yolu ile vücuttan atılır.

#### **XENETIX’i kullanmayı unutursanız:**

XENETIX, teşhis amaçlı kullanılan bir üründür ve size bir doktor tarafından klinikte uygulanmaktadır. Bu nedenle XENETIX’i kullanmayı unutma ihtimaliniz bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi XENETIX’in de, herkeste görülme de yan etkileri olabilir.

Yan etkilerin çoğu enjeksiyon sırasında ya da uygulamayı takip eden ilk bir saat içinde ortaya çıkar. Bazı etkiler, XENETIX enjeksiyonundan bir kaç gün sonra ortaya çıkabilir.

XENETIX ile yan etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçicidir.

**XENETIX’e karşı allerjik reaksiyon gelişme riski seyrek.** Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve **istisnai olarak şoka neden olabilir** (allerjik reaksiyonların hayatınızı tehdit etmesi son derece nadirdir). **Aşağıda listelenen belirtiler şokun ilk işaretleri olabilir.**

**Bunlardan biri sizde olursa XENETIX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

Çok yaygın yan etkiler (10 kişiden en az 1'inde görülen)

**Aşağıdaki bulgulardan biri sizde olursa doktorunuza bildiriniz**

- enjeksiyon bölgesinde ağrı, yerel kızarıklık ve şişkinlik

Çok seyrek yan etkiler (10,000 kişiden en az 1'inde görülen)

**Bunlardan biri sizde olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- yutma veya nefes almada zorluklara yol açabilen, yüzde, dudaklarda ve boğazda şişme
- el ve ayaklarda şişkinlik
- sersemlik hali, şuur bulanıklığı, kan basıncında düşme, kalp ritminde artma, kısa süreli şuur kaybı (senkop)
- ciddi solunum sıkıntısı,
- öksürük, hırıltılı solunum
- sürekli burun akıntısı
- aksırık
- kaşıntı
- ürtiker (ciltte sınırları belirgin kızarıklık)
- deride kızarıklık, kırmızılık, ekzema
- Stevens-Johnson sendromu ya da Lyell Sendromu (içleri sulu kabarcıklarla seyreden ciddi deri hastalıkları)
- bulantı, kusma, karın ağrısı
- şuur kaybıyla birlikte baygınlık (Vazovagal senkop)
- kalp ritminde değişiklik, göğüs ağrısı (anjina) veya kalp krizi
- sıcaklık hissi
- baş ağrısı

XENETIX Beyin tetkiklerinde kullanıldığında:

- huzursuzluk ve sinirlilik (Ajitasyon)
- şuur bulanıklığı
- hayaller görme (halüsinasyon)
- hafıza kaybı
- konuşma ya da işitmede güçlük
- görme güçlüğü (ışığa hassasiyet, geçici körlük)
- titreme ve karıncalanma hissi
- kaslarda zayıflık
- nöbet, koma

Diğer tetkiklerde:

- akciğer ödemi (akciğerlerde aşırı sıvı birikimi)
- böbrek problemleri (akut böbrek yetmezliği)
- guatr (tiroid) hastalıkları

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. XENETIX'in saklanması**

*XENETIX'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

XENETIX'i güneş ve ışıktan uzakta 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Şişe ve kutu üzerinde belirtilen son kullanım tarihinden sonra XENETIX'i kullanmayınız.*

“Son Kull. Tar.:" ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.

*Eğer üründe gözle görülür bir bozulma işareti fark ederseniz, XENETIX'i kullanmayınız.*

*Kalan XENETIX'in imha edilmesi sizden istenecek bir durum değildir. Eğer böyle bir şey olursa ne yapmanız gerektiğini eczacınıza sorun. Burada yapılacaklar çevrenin korunmasına yönelik olacaktır.*

### ***Ruhsat sahibi:***

GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  
Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Sok. Işık Plaza No.7 K.2  
Altunizade – Üsküdar – 34662 – İstanbul  
Tel. 0216 651 47 44

### ***Üretici:***

Guerbet  
BP 57400, 95943 Roissy, CdG Cedex,  
Fransa

*Bu kullanma talimatı 04/04/2014 tarihinde onaylanmıştır.*